第七章 空间解析几何与向量代数

第一节 空间直角坐标系

一、教学基本要求

1. 掌握空间直角坐标系和空间点的直角坐标的概念.
2. 掌握空间两点间的距离公式.

二、答疑解惑

在空间直角坐标系中, xOy 坐标面上方点的坐标有何特征?

答 过 xOy 坐标面上方的点作垂直于 z 轴的平面, 与 z 轴的交点一定在 z 轴的正半轴上, 其竖坐标大于零, 故在空间直角坐标系中, 在 xOy 坐标面上方的点 $M(x, y, z)$ 的竖坐标 z 一定大于零.

三、经典例题解析

题型 空间直角坐标的概念

例 1 指出下列各点所在的坐标面或坐标轴: $A(-2, 1, 0)$, $B(0, -1, 3)$, $C(1, 0, 0)$, $D(0, -1, 0)$.

解 $A(-2, 1, 0)$ 在 xOy 坐标面上, $B(0, -1, 3)$ 在 yOz 坐标面上, $C(1, 0, 0)$ 在 x 轴上, $D(0, -1, 0)$ 在 y 轴上.

例 2 求点 $A(1, 2, 3)$ 分别关于 (1) 各坐标面; (2) 各坐标轴; (3) 坐标原点的对称点的坐标.

解 (1) 点 $A(1, 2, 3)$ 关于 xOy 坐标面的对称点为 $(1, 2, -3)$, 关于 yOz 坐标面的对称点为 $(-1, 2, 3)$, 关于 zOx 坐标面的对称点为 $(1, -2, 3)$; (2) 点 $A(1, 2, 3)$ 关于 x 轴的对称点为 $(1, -2, -3)$, 关于 y 轴的对称点为 $(-1, 2, -3)$, 关于 z 轴的对称点为 $(-1, -2, 3)$; (3) 点 $A(1, 2, 3)$ 关于坐标原点的对称点为 $(-1, -2, -3)$.

例 3 求点 $A(4, -2, -3)$ 到 xOy 坐标面及 y 轴的距离.

解 点 A 到 xOy 坐标面的距离即为点 A 的竖坐标的绝对值, 即点 A 到 xOy 坐标面的距离为 3; 过点 A 作垂直于 xOy 坐标面的直线 AB , 垂足为点 B , 过点 B 再作垂直于 y 轴的直线 BC , 垂足为点 C , 于是直线 AC 垂直于 y 轴, 即线段 AC 的长度为点 A 到 y 轴的距离, 而在直角三角形 ABC 中, $|AC| = \sqrt{|AB|^2 + |BC|^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 于是点 A 到 y 轴的距离为 5.

四、习题选解

1. 求点 $(-2, 3, -5)$ 分别关于下列条件对称点的坐标: (1) xOy 坐标面; (2) y 轴; (3) 坐标原点.

解 (1) 关于 xOy 坐标面的对称点为 $(-2, 3, 5)$; (2) 关于 y 轴的对称点为 $(2, 3, 5)$; (3) 关于坐标原点的对称点为 $(2, -3, 5)$.

2. 求点 $A(4, -3, 5)$ 到坐标原点 $O(0, 0, 0)$, z 轴及 xOz 坐标面的距离.

解 到坐标原点 $O(0, 0, 0)$ 的距离为 $d_1 = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$, 到 z 轴的距离为 $d_2 = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, 到 xOz 坐标面的距离为 $d_3 = 3$.

3. 在 yOz 坐标面上, 求与 $A(3, 1, 2)$, $B(4, -2, -2)$, $C(0, 5, 1)$ 三点等距离的点.

解 设所求点的坐标为 $(0, y, z)$, 因为该点到 $A(3, 1, 2)$, $B(4, -2, -2)$, $C(0, 5, 1)$ 三点的距离相等, 所以 $(z-1)^2 + (y-5)^2 = (z+2)^2 + (y+2)^2 + 4^2$, 并且 $(z-1)^2 + (y-5)^2 = (z-2)^2 + (y-1)^2 + 3^2$, 解得 $y=1$, $z=-2$, 所以该点的坐标为 $(0, 1, -2)$.

4. 在空间直角坐标系中, 指出下列各点所在的卦限: $A(1, -2, 3)$, $B(2, 3, -4)$, $C(2, -3, -4)$, $D(-2, -3, 1)$.

解 $A(1, -2, 3)$ 在第四卦限, $B(2, 3, -4)$ 在第五卦限, $C(2, -3, -4)$ 在第八卦限, $D(-2, -3, 1)$ 在第三卦限.

5. 求点 (a, b, c) 分别关于 (1) 各坐标面; (2) 各坐标轴; (3) 坐标原点的对称点.

解 (1) 关于 xOy 面的对称点为 $(a, b, -c)$, 关于 yOz 面的对称点为 $(-a, b, c)$, 关于 xOz 面的对称点为 $(a, -b, c)$;

(2) 关于 x 轴的对称点为 $(a, -b, -c)$, 关于 y 轴的对称点为 $(-a, b, -c)$, 关于 z 轴的对称点为 $(-a, -b, c)$;

(3) 关于坐标原点的对称点为 $(-a, -b, -c)$.

6. 试证明以 $A(4, 1, 9)$, $B(10, -1, 6)$, $C(2, 4, 3)$ 三点为顶点的三角形是等腰直角三角形.

证明 由空间直角坐标系中两点距离公式得三角形三条边长分别为

$$AB = \sqrt{(4-10)^2 + (1+1)^2 + (9-6)^2} = 7, \quad AC = 7, \quad BC = 7\sqrt{2}.$$

显然有 $AB = AC = 7$, $AB^2 + AC^2 = BC^2$, 所以此三角形不仅是等腰的还是直角的, 即为等腰直角三角形.

第二节 向量及其加减法 向量与数的乘法

一、教学基本要求

1. 理解向量的概念.
2. 掌握向量的线性运算.
3. 理解向量的几何表示.

二、答疑解惑

1. 任何向量都有确定的方向吗?

答 应当说, 任何非零向量都有确定的方向, 而零向量的方向是任意的.

2. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 均为非零向量, 它们满足什么条件, 可以使下面的式子成立?

$$(1) |\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|; \quad (2) |\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| < |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|; \quad (3) |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|.$$

答 (1) 由向量加、减法的平行四边形法则可知, 在以向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形中, $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|$, $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$ 都表示平行四边形两条对角线的长度. 若两条对角线的长度相等, 则该平行四边形应是矩形, 故当 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 垂直时, $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$.

(2) 根据前面的讨论可知, 当 $(\widehat{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}}) > \frac{\pi}{2}$ 时, $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| < |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$ 成立.

(3) 根据向量减法的三角形法则知, 一般来说, $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| < |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$, 仅当 $(\widehat{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}}) = \pi$ 时, 才有 $|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$.

3. 向量之间可以比较大小吗?

答 不能. 向量是既有大小, 又有方向的量, 无所谓大小. 但是, 向量的模是一个实数, 所以说, 两个向量可以比较它们模的大小.

4. 下列式子的几何意义是什么? (1) $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \mathbf{0}$; (2) $\boldsymbol{c} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{b}$, 其中 λ, μ 为实数.

答 根据多个向量相加的法则, (1) 表示当三个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 依次首尾相接时, 第三个向量的终点与第一个向量的起点相接, 所以 (1) 表示或是三个向量共线, 或是以三个向量为边构成一个三角形.

(2) 表示向量 $\boldsymbol{c}$ 可由向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 经线性运算得到 (也称 $\boldsymbol{c}$ 能由 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 线性表示), 因此, 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不平行时, $\boldsymbol{c}$ 平行于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 确定的平面, 即 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面; 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行时, $\boldsymbol{c}$ 平行于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$.

三、经典例题解析

题型 有关向量的运算问题

例 1 设 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} + \boldsymbol{c}$, 试用 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 表示 $3\boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{v}$.

解 $3\boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{v} = 3(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}) - 2(2\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} + \boldsymbol{c}) = 5\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} - 5\boldsymbol{c}$.

例 2 已知非零向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$, 求一个向量 $\boldsymbol{c}$, 使之平分向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 之间的夹角.

解 因为向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 为非零向量, 所以其单位向量 $\boldsymbol{a}^0$, $\boldsymbol{b}^0$ 存在, 且 $\boldsymbol{a}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$, $\boldsymbol{b}^0 = \frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.

以 $\boldsymbol{a}^0$, $\boldsymbol{b}^0$ 为邻边所生成的平行四边形是一个菱形, 这个菱形的对角线平分对角, 于是可取

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}^0 + \boldsymbol{b}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} + \frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}.$$

例 3 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{BC} = -4\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{CD} = -5\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}$, 证明四边形 $ABCD$ 为梯形.

分析 利用向量关系证明四边形 $ABCD$ 中的一组对边互相平行, 则可知四边形 $ABCD$ 为梯形.

证明 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) + (-4\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) + (-5\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}) = -8\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b} = 2\overrightarrow{BC}$, 所以向量 $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$, 即四边形 $ABCD$ 中的一组对边 AD 和 BC 互相平行, 于是四边形 $ABCD$ 为梯形.

例4 设 $\triangle ABC$ 的边 AB 被点 M 和 N 三等分, 已知 $\overrightarrow{CM} = \mathbf{m}$, $\overrightarrow{CN} = \mathbf{n}$, 求 $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$.

解 将 CM 延长到 D , 使得 $|\overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{CM}|$, 连接 AD , ND , 则 $ACND$ 是平行四边形. 因此有 $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{CM}$, 即 $\overrightarrow{CA} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$. 同理可得 $\overrightarrow{CB} = 2\mathbf{n} - \mathbf{m}$.

四、习题选解

1. 如果平面上一个四边形的对角线互相平分, 试用向量证明它是平行四边形.

解 如图7-1所示, 点 M 为对角线 AC 与 BD 的交点, 则 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MD}$, 因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{DC}$, 所以 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{DC}$ 且 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{DC}|$, 于是四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

图 7-1

2. 设 $\mathbf{u} = \mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - \mathbf{c}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示 $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$.

解 $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = 2(\mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}) - 3(-\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - \mathbf{c}) = 5\mathbf{a} - 11\mathbf{b} + 7\mathbf{c}$.

第三节 向量的坐标

一、教学基本要求

1. 理解向量在坐标轴上的投影.
2. 理解向量的坐标.
3. 掌握向量的模与方向余弦的坐标表达式.
4. 掌握单位向量的坐标表达式.

二、答疑解惑

1. 如何确定一个向量?

答 确定向量通常有两种方法, 一是依据向量既有大小又有方向的特点, 分别求出它的大小(模)和方向(方向角或方向余弦); 二是求出向量的三个坐标, 不妨设为 a_x, a_y, a_z , 即可写出向量 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$.

2. 怎样求向量的坐标?

答 求向量的坐标, 要根据已知的条件, 采取不同的方法.

(1) 若已知向量 $\mathbf{a}$ 按基本单位向量的分解式, 即 $\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$, 则 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$.

(2) 若已知向量的起点坐标 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和终点坐标 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$.

(3) 若已知向量 $\mathbf{a}$ 的模和方向角 α, β, γ , 则 $\mathbf{a} = \{|\mathbf{a}| \cos \alpha, |\mathbf{a}| \cos \beta, |\mathbf{a}| \cos \gamma\}$.

(4) 若已知 $\mathbf{a}$ 平行于 $\mathbf{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, 则 $\mathbf{a} = \{\lambda b_x, \lambda b_y, \lambda b_z\}$, 其中数 λ 由 $\mathbf{a}$ 的模和方向确定.

(5) 根据向量的运算性质确定.

三、经典例题解析

题型 有关向量的坐标问题

例 1 已知向量 $\mathbf{a}$ 的模为 3, 且其方向角为 $\alpha = \gamma = 60^\circ$, $\beta = 45^\circ$, 求向量 $\mathbf{a}$.

解 根据已知条件, 可得向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \gamma = \frac{1}{2}$, 于是

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k} = |\mathbf{a}| \cos \alpha \mathbf{i} + |\mathbf{a}| \cos \beta \mathbf{j} + |\mathbf{a}| \cos \gamma \mathbf{k} = \frac{3}{2} \mathbf{i} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{3}{2} \mathbf{k}.$$

例 2 从点 $A(2, -1, 7)$ 沿着向量 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 的方向取 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{38}$, 求点 B 的坐标.

解 设点 B 的坐标为 (x, y, z) , 则向量 $\overrightarrow{AB} = \{x-2, y+1, z-7\}$. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 的一个方向向量为 $\mathbf{s} = \{3, 5, -2\}$, 于是向量 $\overrightarrow{AB}$ 和向量 $\mathbf{s}$ 互相平行且方向一致, 可得 $\frac{x-2}{3} =$

$$\frac{y+1}{5} = \frac{z-7}{-2}. \quad \text{令 } \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-7}{-2} = k (k > 0), \quad \text{则}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-7)^2} = \sqrt{(3k)^2 + (5k)^2 + (-2k)^2} = \sqrt{38},$$

解得 $k=1$, 于是 $x=3k+2=5$, $y=5k-1=4$, $z=-2k+7=5$, 所以点 B 的坐标为 $(5, 4, 5)$.

例 3 求与向量 $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ 平行的单位向量.

解 与向量 $\mathbf{a}$ 平行的向量有无数多个, 但与 $\mathbf{a}$ 平行的单位向量只有两个, 它们是 $\pm \mathbf{a}^0 = \pm \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \pm \frac{1}{\sqrt{14}} \{1, 3, -2\}$, 其中 $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$.

四、习题选解

1. 已知 $A(1, 0, 2)$, $B(4, 5, 10)$, $C(0, 3, 1)$, $D(2, -1, 6)$ 和 $\mathbf{m} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, 求: (1) 向量 $\mathbf{a} = 4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{CD} - \mathbf{m}$ 在三个坐标轴上的投影及分向量; (2) $\mathbf{a}$ 的模; (3) $\mathbf{a}$ 的方向余弦; (4) 与 $\mathbf{a}$ 平行的两个单位向量.

解 (1) $\overrightarrow{AB} = \{3, 5, 8\}$, $\overrightarrow{CD} = \{2, -4, 5\}$, $\mathbf{a} = 4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{CD} - \mathbf{m} = \{13, 7, 51\}$, 所以 $\mathbf{a}$ 在三个坐标轴上的投影分别为 $a_x = 13$, $a_y = 7$, $a_z = 51$, 在三个坐标轴上的分向量分别为 $a_x \mathbf{i} = 13\mathbf{i}$, $a_y \mathbf{j} = 7\mathbf{j}$, $a_z \mathbf{k} = 51\mathbf{k}$.

$$(2) |\mathbf{a}| = \sqrt{13^2 + 7^2 + 51^2} = \sqrt{2819}.$$

$$(3) \cos \alpha = \frac{13}{\sqrt{2819}}, \quad \cos \beta = \frac{7}{\sqrt{2819}}, \quad \cos \gamma = \frac{51}{\sqrt{2819}}.$$

$$(4) \text{与 } \mathbf{a} \text{ 平行的两个单位向量为 } \frac{1}{\sqrt{2819}} \{13, 7, 51\} \text{ 与 } -\frac{1}{\sqrt{2819}} \{13, 7, 51\}.$$

2. 已知 $A(2, -1, 7)$, $B(4, 5, -2)$, 线段 AB 交 xOy 面于点 P , 且 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, 求 λ 的值.

解 设点 $P(x, y, 0)$, 则 $\overrightarrow{AP} = \{x-2, y+1, -7\}$, $\overrightarrow{PB} = \{4-x, 5-y, -2\}$, 又因为

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}, \text{ 可得 } \begin{cases} x-2 = \lambda(4-x), \\ y+1 = \lambda(5-y), \\ -7 = \lambda(-2), \end{cases} \text{ 解得 } \lambda = \frac{7}{2}.$$

3. 一个向量的终点在点 $B(2, -1, 7)$, 它在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影依次为 4, -4 和 7, 求这个向量的起点 A 的坐标.

解 设 $A(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \{2-x, -1-y, 7-z\}$, 由题意知 $\overrightarrow{AB} = \{4, -4, 7\}$, 解得 $x = -2$, $y = 3$, $z = 0$, 于是点 A 的坐标是 $(-2, 3, 0)$.

4. 设向量 a 的模为 4, 它与 u 轴的夹角为 60° , 求 a 在 u 轴上的投影.

解 $\text{Prj}_u a = |a| \cos 60^\circ = 4 \times \frac{1}{2} = 2$.

5. 设向量的方向余弦分别满足 (1) $\cos \alpha = 0$; (2) $\cos \beta = 1$; (3) $\cos \alpha = \cos \beta = 0$, 问这些向量与坐标轴或坐标面的关系如何?

解 (1) 此向量垂直于 x 轴, 平行于 yOz 坐标面.

(2) 此向量指向与 y 轴正方向一致, 垂直于 xOz 坐标面.

(3) 此向量平行于 z 轴, 垂直于 xOy 坐标面.

第四节 数量积 向量积 混合积

一、教学基本要求

1. 熟练掌握用坐标表达式进行向量的数量积与向量积的运算.
2. 掌握两个向量夹角的求法.
3. 熟练掌握两个向量互相垂直、平行的条件.

二、答疑解惑

1. 设 $a \neq 0$, $a \cdot b = a \cdot c$, 或 $a \times b = a \times c$, 那么 $b = c$ 成立吗?

答 在数量积和向量积的运算中, 这种消去律不成立. $a \cdot b = a \cdot c$ 等价于 $a \cdot (b - c) = 0$, 因此只要 $b - c$ 与 a 垂直就有 $a \cdot b = a \cdot c$, 但是 $b - c$ 与 a 垂直不一定有 $b - c = 0$. 例如 $a = \{1, 0, 1\}$, $b = \{1, 1, 0\}$, $c = \{0, 1, 1\}$, 则 $a \cdot b = a \cdot c = 1$, 显然 $b \neq c$.

$a \times b = a \times c$ 等价于 $a \times (b - c) = 0$, 因此只要 $b - c$ 与 a 共线, 就有 $a \times b = a \times c$. 但是 $b - c$ 与 a 共线不一定有 $b - c = 0$. 例如 $a = \{1, 0, 1\}$, $b = \{1, 1, 0\}$, $c = \{0, 1, -1\}$, 则 $a \times b = a \times c = \{-1, 1, 1\}$, 显然 $b \neq c$.

2. 若向量 a 与 b 都是单位向量, 那么 $a \times b$ 也是单位向量吗?

答 不一定. 由于 $a \times b$ 是个向量, 只有当 $|a \times b| = 1$ 时, 它才是单位向量, 但是 $|a \times b| = |a||b|\sin(\widehat{a, b})$, 所以当向量 a 与 b 都是单位向量且它们相互垂直时, $a \times b$ 才是单位向量.

3. 以下等式成立吗? 为什么?

$$(1) \mathbf{a}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 \mathbf{b}; \quad (2) |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2.$$

答 在一般情况下, 以上二式都不对.

(1) 的左端是与 $\mathbf{a}$ 平行的向量, 而右端是与 $\mathbf{b}$ 平行的向量. 只有当 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 时, (1) 才成立.

(2) 的左端 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2 = (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}))^2 = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2 \cdot \cos^2(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$, 而右端却没有 $\cos^2(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$, 所以只有当 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ 时, (2) 才成立.

4. 数量积的主要用途有哪些?

答 (1) 求向量的模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$.

(2) 求两个向量的夹角: 当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 时, $(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \arccos \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$.

(3) 求一个向量在另一个向量上的投影: $\text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|} = \mathbf{a}^0 \cdot \mathbf{b}$.

特别地, 向量 $\mathbf{a}$ 在直角坐标系中的坐标为: $a_x = \text{Prj}_{\mathbf{i}} \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i}$; $a_y = \text{Prj}_{\mathbf{j}} \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{j}$; $a_z = \text{Prj}_{\mathbf{k}} \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{k}$.

(4) 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直的充分必要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 或 $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$.

5. 向量积的主要用途有哪些?

答 (1) 求与两个非共线向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同时垂直的向量 $\mathbf{s}$, 可取 $\mathbf{s} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{s} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

(2) 求由两个非共线向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所确定的平面的法向量 $\mathbf{n}$, 可取 $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

(3) 求以向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积: $S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.

(4) 给定不共线的三点 A, B, C , 求点 C 到直线 AB 的距离: $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|}$.

(5) 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行 (即共线) 的充分必要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 或 $\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$.

三、经典例题解析

题型 有关向量的数量积与向量积的运算

例 1 填空: (1) 设向量 $\mathbf{a} = \{3, 2, 1\}$, $\mathbf{b} = \left\{2, \frac{4}{3}, k\right\}$, 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直, 则 $k =$ _____; 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行, 则 $k =$ _____. (2) 设 $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 4$, 且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直, 则 $|(a + b) \times (a - b)| =$ _____.

解 (1) 应分别填 $-\frac{26}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$. 因为若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 即 $3 \cdot 2 + 2 \cdot \frac{4}{3} + 1 \cdot k = 0$, 从而解得 $k = -\frac{26}{3}$; 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行, 则对应坐标成比例, 即 $\frac{3}{2} = \frac{2}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{k}$, 从而解得 $k = \frac{2}{3}$.

(2) 应填 24. 因为 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\mathbf{a}\times\mathbf{a}-\mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{b}=\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{a}\times\mathbf{b}=2(\mathbf{b}\times\mathbf{a})$, 注意到已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直, 故

$$|(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times(\mathbf{a}-\mathbf{b})|=2|\mathbf{b}\times\mathbf{a}|=2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\frac{\pi}{2}=2\times3\times4\times1=24.$$

例 2 求向量 $\mathbf{a}=3\mathbf{i}+\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ 在向量 $\mathbf{b}=\mathbf{i}-2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ 上的投影.

解 向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影为 $\text{Prj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}=\frac{3\times1+1\times(-2)+2\times2}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\frac{5}{3}$.

例 3 求向量 $\mathbf{b}$, 使得它与向量 $\mathbf{a}=2\mathbf{i}-\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ 平行, 且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-18$.

解 设向量 $\mathbf{b}$ 的坐标为 $\{x, y, z\}$, 由已知可得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2x-y+2z=-18$, 又因为向量 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a}$ 平行, 所以令 $\frac{x}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{2}=k$, 则 $x=2k$, $y=-k$, $z=2k$, 将它们代入到 $2x-y+2z=-18$ 中, 得到 $k=-2$. 于是 $x=-4$, $y=2$, $z=-4$, 所以向量 $\mathbf{b}$ 的坐标为 $\{-4, 2, -4\}$.

例 4 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两垂直, 且 $|\mathbf{a}|=1$, $|\mathbf{b}|=2$, $|\mathbf{c}|=3$, 求向量 $\mathbf{d}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ 的模和它与向量 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ .

解 $|\mathbf{d}|^2=\mathbf{d}\cdot\mathbf{d}=(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+|\mathbf{c}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+2\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+2\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=14$, 所以 $|\mathbf{d}|=\sqrt{14}$. 又

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{d}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{d}||\mathbf{b}|}=\frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{d}||\mathbf{b}|}=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{d}||\mathbf{b}|}=\frac{4}{\sqrt{14}\times2}=\frac{2}{\sqrt{14}},$$

故 $\theta=\arccos\frac{2}{\sqrt{14}}$.

例 5 已知 $|\mathbf{a}|=2$, $|\mathbf{b}|=5$, $|\mathbf{c}|=7$, 并且 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$, 计算 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{b}\times\mathbf{c}+\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 的值.

解 因为 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=-\mathbf{c}$, 又因为 $|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=|-\mathbf{c}|=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$, 所以向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 同向, 向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{c}$ 反向, 向量 $\mathbf{b}$ 也与向量 $\mathbf{c}$ 反向, 于是

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=2\times5\cos 0+5\times7\cos\pi+7\times2\cos\pi=10-35-14=-39.$$

进一步地, $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin 0=0$, $|\mathbf{b}\times\mathbf{c}|=|\mathbf{b}||\mathbf{c}|\sin\pi=0$, $|\mathbf{c}\times\mathbf{a}|=|\mathbf{c}||\mathbf{a}|\sin\pi=0$, 因此

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{b}\times\mathbf{c}=\mathbf{c}\times\mathbf{a}=\mathbf{0},$$

所以 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{b}\times\mathbf{c}+\mathbf{c}\times\mathbf{a}=\mathbf{0}$.

例 6 若 $|\mathbf{a}|=\sqrt{3}$, $|\mathbf{b}|=1$, 且 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{\pi}{6}$, 求: (1) 向量 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的夹角; (2) 以向量 $\mathbf{a}+2\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a}-3\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.

解 (1) 设向量 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 的夹角为 α , 则 $\cos\alpha=\frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})}{|\mathbf{a}+\mathbf{b}||\mathbf{a}-\mathbf{b}|}$. 由题设可知

$$|\mathbf{a}|^2=3, |\mathbf{b}|^2=1, \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})=\sqrt{3}\times1\times\cos\frac{\pi}{6}=\frac{3}{2}, |\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=7,$$

即 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{7}$. $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$, 即 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$.

又因为 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 2$, 所以 $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{7}}$, 即 $\alpha = \arccos \frac{2}{\sqrt{7}}$.

(2) 所求平行四边形的面积为

$$|(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - 3\mathbf{b})| = |-5(\mathbf{a} \times \mathbf{b})| = 5|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \frac{\pi}{6} = \frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

注 平行四边形的面积是由向量积的模的几何意义得到的, 在这里向量积 $(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - 3\mathbf{b})$ 的模 $|(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - 3\mathbf{b})|$ 表示以向量 $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.

例 7 证明: (1) 若 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{d}$, $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{d}$, 则 $\mathbf{a} - \mathbf{d}$ 与 $\mathbf{b} - \mathbf{c}$ 共线; (2) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

证明 (1) 要证两个向量共线, 即证两个向量平行, 亦即证 $(\mathbf{a} - \mathbf{d}) \times (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{0}$. 因为

$$(\mathbf{a} - \mathbf{d}) \times (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{a} \times \mathbf{c} - \mathbf{d} \times \mathbf{b} + \mathbf{d} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{b} \times \mathbf{d} + \mathbf{b} \times \mathbf{d} - \mathbf{c} \times \mathbf{d} = \mathbf{0},$$

所以 $\mathbf{a} - \mathbf{d}$ 与 $\mathbf{b} - \mathbf{c}$ 共线.

(2) 设向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 因为 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta$, $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \cos^2 \theta$, 所以

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta + |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \cos^2 \theta = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2.$$

例 8 已知向量 $\overrightarrow{M_1 M_2} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{M_1 M_3} = \mathbf{b}$, 且两个向量的夹角为 θ . 过点 M_2 作线段 $M_1 M_3$ 所在的直线的垂线, 垂足为点 D . (1) 证明 $\triangle M_1 M_2 D$ 的面积等于 $\frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{2|\mathbf{b}|^2}$; (2) 求向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ 为何值时, $\triangle M_1 M_2 D$ 的面积取得最大值?

解 (1) 设 $\triangle M_1 M_2 D$ 的面积为 S , 则 $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{M_1 D}| \cdot |\overrightarrow{M_2 D}| = \frac{1}{2} |\mathbf{a}| |\cos \theta| |\mathbf{a}| \sin \theta = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 |\sin 2\theta|$. 又因为 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| |\cos \theta|$, $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$, 所以

$$\frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{2|\mathbf{b}|^2} = \frac{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin \theta |\cos \theta|}{2|\mathbf{b}|^2} = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 |\sin 2\theta| = S.$$

(2) 由 $S(\theta) = \frac{1}{4} |\mathbf{a}|^2 |\sin 2\theta|$, 可得当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 时, $\triangle M_1 M_2 D$ 的面积取得最大值.

四、习题选解

1. 判断题:

(1) 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$. ()

(2) 若 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$. ()

(3) 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$. ()

(4) 若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. ()

(5) 若 $\mathbf{a}^0, \mathbf{b}^0$ 均是单位向量, 则 $\mathbf{a}^0 \times \mathbf{b}^0$ 也是单位向量. ()

(6) 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 均为非零向量, 并且 $\mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}, \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 相互垂直且均为单位向量. ()

$$(7) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}), \mathbf{a} \times \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}). \quad ()$$

$$(8) \text{若 } \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ 均为单位向量, 且 } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}, \text{ 则 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1. \quad ()$$

解 (1) ×; (2) ×; (3) ×; (4) ×; (5) ×; (6) √; (7) ×; (8) ×.

2. 求向量 $\mathbf{a} = \{4, -3, 4\}$ 在向量 $\mathbf{b} = \{2, 2, 1\}$ 上的投影.

$$\text{解 } \text{Pr}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = 2.$$

3. 设 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, 求: (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 及 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$; (2) $(-2\mathbf{a}) \cdot 3\mathbf{b}$ 及 $\mathbf{a} \times 2\mathbf{b}$; (3) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的余弦.

$$\text{解 } (1) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \times 1 + (-1) \times 2 + (-2) \times (-1) = 3, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j} + 7\mathbf{k}.$$

$$(2) (-2\mathbf{a}) \cdot 3\mathbf{b} = (-6)\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -18, \quad \mathbf{a} \times 2\mathbf{b} = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 2(5\mathbf{i} + \mathbf{j} + 7\mathbf{k}) = 10\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 14\mathbf{k}.$$

$$(3) \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{3}{2\sqrt{21}}.$$

4. 已知 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, 求 $\triangle OAB$ 的面积.

$$\text{解 } \text{因为 } \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}, \text{ 所以}$$

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \frac{1}{2} \sqrt{9+9+1} = \frac{\sqrt{19}}{2}.$$

5. 试用向量证明直径所对的圆周角是直角.

证明 如图 7-2 所示, 给定一个圆 O , $\angle AMB$ 是直径 AB 所对的圆周角. 因为

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) = (-\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) \\ &= -|\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OM}|^2 = 0, \end{aligned}$$

所以 $\angle AMB$ 是直角.

图 7-2

6. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为单位向量, 且满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 求 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$.

解 由 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 得 $\mathbf{a} = -(\mathbf{b} + \mathbf{c})$, $\mathbf{b} = -(\mathbf{c} + \mathbf{a})$, $\mathbf{c} = -(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 所以

$$\begin{aligned} 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) &= \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{c}) + \mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{b} \cdot (-\mathbf{b}) + \mathbf{a} \cdot (-\mathbf{a}) + \mathbf{c} \cdot (-\mathbf{c}) = -3, \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = -\frac{3}{2}.$$

7. 已知 $M_1(1, -1, 2)$, $M_2(3, 3, 1)$ 和 $M_3(3, 1, 3)$. 求与 $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_2M_3}$ 同时垂直的单位向量.

解 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{2, 4, -1\}$, $\overrightarrow{M_2M_3} = \{0, -2, 2\}$, $\mathbf{a} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_2M_3} = \{6, -4, -4\}$, 所求单